



Eerstelijns Verblijf (ELV)

Patiënten komen in aanmerking voor ELV als:

- ✓ Er geen (acute) specialistische diagnostiek of behandeling nodig is
- ✓ Tijdelijk niet in staat zijn om terug te keren naar huis vanwege de zorgbehoefte.
- ✓ Zorg is gericht op herstel met maximaal één betrokken paramedicus.
- ✓ Patiënt is gemotiveerd en gericht op herstel naar huis.
- ✓ Terminale fase met een levensverwachting van minder dan drie maanden (ELV palliatief).
- ✓ In de aanvraag is duidelijk gespecificeerd of de aanmelding Hoog Complex of Laag Complex is.

Patiënten komen niet in aanmerking voor ELV als zij:

- ✗ 24-uurs toezicht nodig hebben.
- ✗ Matig tot gevorderde dementie.
- ✗ Niet adequaat kunnen alarmeren.
- ✗ Acute specialistische diagnostiek of behandeling nodig hebben.
- ✗ Verslavingsproblematiek (drugs, alcohol) hebben.
- ✗ Gedragsproblemen vertonen, zoals agressie, ernstige onrust, decorumverlies, dwalen of suïcidaal gedrag.
- ✗ Een delirium hebben.
- ✗ Een sociale indicatie hebben, zoals woonproblematiek.
- ✗ Een (in aanvraag zijnde) WLZ-indicatie hebben (uitzonderingen mogelijk)
- ✗ Een complexe zorgvraag hebben die multidisciplinaire zorg en specifieke hulpmiddelen vereist.
- ✗ Overbelasting van de mantelzorger als reden van opname hebben (respijtzorg).
- ✗ Naar verwachting niet meer naar huis kunnen.



Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

Patiënten komen in aanmerking voor GRZ als zij:

- ✓ Medisch stabiel zijn.
- ✓ Een revalidatievraag hebben en hierdoor tijdelijk niet kunnen terugkeren naar huis.
- ✓ Interdisciplinaire behandeling nodig hebben (meerdere paramedici betrokken).
- ✓ Gemotiveerd en gericht zijn op herstel naar huis.
- ✓ Voldoende leerbaar en trainbaar zijn.
- ✓ Belastbaar zijn voor therapie.

Patiënten komen niet in aanmerking voor GRZ als zij:

- ✗ 24-uurs toezicht nodig hebben.
- ✗ Matig tot gevorderde dementie.
- ✗ Niet adequaat kunnen alarmeren.
- ✗ Verslavingsproblematiek (drugs, alcohol) hebben.
- ✗ Gedragsproblemen vertonen, zoals agressie, ernstige onrust, decorumverlies, dwalen of suïcidaal gedrag.
- ✗ Een delirium hebben.
- ✗ Een sociale indicatie hebben, zoals woonproblematiek.
- ✗ Een WLZ-indicatie hebben, inclusief behandeling (uitzonderingen mogelijk)
- ✗ Overbelasting van de mantelzorger als reden van opname hebben (respijtzorg).
- ✗ Naar verwachting niet meer naar huis kunnen.